



אישור ייבוא של סייטס 1 שהינו שבי ופתיחת השוק של הזוחלים לעוד מגוון

נושא: שאפינדקס 1 ריבוי שבי שנחשב אפפינדקס 2 על פי סייטס/CITIES,

1) בישראל אזור יובא או החזקה לאור החלטה תמוה של רט"ג. על ידי כך רט"ג מונעים מהקהילה להמשיך לקיים זוחלים שנמצאים בהיתר בתוך הארץ כגון בואה דומיריליס להיות מוחזק על ידי אנשים פרטים מסיבות לא מובנות וזוחלים נוספים. סייטס מאשר החזקה של אותם חיות לאור שהם גידול שבי ויש להתאים את לקו של רט"ג לסייטס.

2) בנוסף יש לאשר ייבוא של אותם חיות לישראל שהם נמצאים ונחשבים כאפפינדקס 1 גידול שבי שהופך את אותו חיה לאפפינדקס 2 על פי סייטס.

3) רט"ג ומדינת ישראל מונעים מהקהילה של הזוחלים להתפתח ולהגיל את מגוון החיות שמאפשרות להחזקה וגם מונעות מהלביא ולהחזיק חיות שיותר מותאמות למגדל הישראלי והנה דוגמה מובהקת Fiji banded iguanan מול איגואנה ירוקה ששניהם לדיטי מים והחלטה של אותו מגדל. האיגואנה הפיגי נשארת בממידים שיותר קלים להחזקה גם מבחינה כלכלית לגבי מקום אנו מאמינים בכמה שיותר שמוגדר על פי שיטת המידור קבוצות

Fiji banded iguan

- האיגואנה הפיגי היא יותר קטנה ויותר חסכונית - צריכה גם מקום כפי שיומלץ על פי ההגדרות של מידור קבוצות.
1) על פי סייטס כל חיה יכולה להיסחר בין מדינות של אפפינדקס 1 אם זה ריבוי שבי בלבד ונהפך על ידי כך לאפפינדקס 2



GREEN IGUANS - איגואנה ירוקה



רט"ג מונעת מהקהילה לגדל נחשים מדהימים כגון הבואה הדומיריליס - Dumeril's-Boa. ועוד חיות רבות וזה דוגמה, כי זה באפפינדיקס 1 שהינו ריבוי שבי לכן הינו על פי סיטיס אפפינדיקס 2. תמוה הסיבה של רט"ג להכביד ולצמצם את מגוון הזוח' לים שהקהילה יכולה לגדל ולהתרחב.



מידור גידול זוחלים על פי קבוצות שמחולקות לקושי ואספקת תנאי מחייה שזה יכולת כלכלית
* ניקח לדוגמא לטאות וכחים כדי להבין את הסיטואציה שלפנינו

1) קבוצה 1 - מתחילים - הנכנסים לתחום

2) קבוצה 2 סטאזיונרים - שנה + ניסיון באותה קטגוריה - עם לעבור קורס לרמה 2

3) קבוצה 3 מתקדמים - 3 + ניסיון בכמה קטגוריה וסאב- עם לעבור קורס לרמה 3

4) קבוצה 3 מומחים - 4 + ניסיון בכמה קטגוריה וסאב- עם לעבור קורס לרמה 4

נא להחזיר כחים לרשימות הלבנות-


- 1) כחים ננסיים - אפשר לחשוב על קורס אונליין / זום להסבר ראשוני על נשל או
 - 1.1) כח אקי ספייני טיל - קבוצה 1
 - 1.2) כח ראש שחור - קבוצה 1
 - 1.3) כח קימבירלי - קבוצה 2
 - 1.4) כח המלק - קבוצה 2
 - 1.5) פילבארה - קבוצה 2

ועוד

2) כוחים בינוניים קבוצת מידור 2 לניסיון של שנה + לגידול כחים בגודל עד 1.5 ומעבר קורס של הרט"ג - הקורס יכלול הכרת הכחים, סוגי הכחים (מים, מדברי, אקלים עם משקעים ולחות)

- סוואנה - קבוצה 2
- גרון שחור - קבוצה 3
- גרון לבן - קבוצה 2
- כח מים אסייתי - קבוצה 3

כל הכחים האלו חיים באזור הטרופי ברובו וישראל לא נמצאת בקו המשווה הזה - שם יש מדבריות עם משקעים וכאן בישראל זה מדבר יבש ברובו.



גידול זוחלים מקומיים או מקביליהם בעולם באישור הרט"ג

1) אנחנו הקהילה מעוניינים בגידול זוחלים שהם ארץ ישראלים ושנושא זה יוס' דר על ידי הרט"ג בהקדם.

2) אנחנו דורשים את האפשרות לגדל את הזוחלים הבאים שנמאים בישראל ולדעתנו נגרם עוול לקהילה שנמנע מאיתנו לגדל זוחלים מדהימים אלו:

חרדון צב - תפוצות בעולם

נא לאשר גידול מקומי וייבוא של חרדוני צב מתפוצת מהעולם שהם גם יותר קטנים מהתפוצה המקומית, לא מהווים איום לאוכלוסייה המקומית לאור שהם יותר קטנים וצריכים את אותם תנאים.

יורומסטיקס צהוב



יורומסטיקס כחול



יורומסטיקס אדום



Ocellated Uromastyx

יורומסטיקס סודני



Mali Uromastyx



יורומסטיקס סהרה
Saharan Uromastyx



Moroccan Uromastyx



חרדון צב - תפוצות מקומיות

נא לאשר גידול מקומי וייבוא של חרדוני צב מהתפוצות המקומיות שנוכל ליהנות ולהכיר את הזוחלים שלנו. אפשר לקחת את דוגמת אוסטרליה שמאשרים גידול והרבייה של זוחלים מקומיים לאור הסגר שהם עושים לשמירת החי שלהם ובאותה עת להשכיל את האוכ' לוסיה שלהם לגבי הזוחלים המקומים ואישור גידול והרבייה בשיטת היתרי קבוצות לגידול.

Ornate Uromastyx



Egyptian Uromastyx



Species	Size	Color	Appearance
Egyptian	30 to 36"	Tan or gray	Large with limited patterning (if any).
Ornate	12 to 14"	Blue, green, orange, white and yellow	Medium size with blue base color and yellow bands of spots across their back.
Mali	10 to 15"	Black, gray and yellow	Black or gray body with many small yellow spots along their back and legs.
Yellow	12 to 15"	Yellow, orange and black	Gradient of white to yellow and orange extending down their back interspersed with round black markings.
Red	12 to 15"	Red, orange and black	Gradient of white to orange and red extending down their back interspersed with round black markings.
Saharan	11 to 13"	Yellow, orange or red	Yellow or red/orange with small black spots and lines across their body.
Moroccan	12 to 15"	Black, orange, yellow, red and white	Medium size with a gradient of white, yellow or red.
Blue	12 to 14"	Blue and green	Shades of blue and green with patterns of yellow and orange.
Ocellated	12"	Gray	Small gray body with orange or white spots.
Sudanese	14"	Brown	Brown with lighter tan spots along their back.

חומט רפואי

Scincus scincus

נא לאשר גידול, הרבייה ואחזקה

החומט הרפואי הוא מין של חומט שתפוצתו מוגבלת למדבריות של צפון אפריקה, סיני וישראל. בעבר נחשב בשרו המיובש והכתוש לאבקה כתרופה לתחלואים שונים, וזו הסיבה לשמו – רפואי.

החומט הרפואי מתייחד בהתאמתו לחיים בחולות. חרטומו משוטח ונראה כיתד רחבה. בעזרתו הוא מיטיב להתחפר בחול. הלסת העליונה חופה על הלסת התחתונה, וכך נמנעת חדירת חול לפה. קשקשים מגינים על פתח האוזן מפני חדירת חול. צבע הגוף צהבהב או חום בהיר, כצבע החול. הגחון בהיר. לבוגרים פסי רוחב כהים, המתבלטים על הרקע הבהיר. הרגליים מפותחות היטב, 5 אצבעות מצוידות בטפרים חדים. בצידי האצבעות קשקשים משוננים, המרחיבים את שטחן ומונעים שקיעה בחול. התנועה על פני החול ובתוך החול בתנועות "שחייה".

החומט הרפואי ניזון בחרקים ובפרוקי רגליים אחרים, שאותם הוא צד על פני החול ובתוכו. ניזון לעיתים גם מפרטי מזון צמחי. מצב שימור: LC (לא בסיכון)





חטיבת פיקוח ואכיפה
האגף להגנה על החי והצומח

יש למלא בטופס זה את פרטי המינים המבוקשים. הפניה תועבר על טופס זה בלבד.

מספר	שם לטיני מלא	שם מקובל	קוד *	לשימוש המשרד
1	<i>Xenagama taylori</i>	Shield-tailed agama		
2	<i>Dracaena guianensis</i>	Northern caiman lizard		
3	<i>Egernia stokesii</i>	Stokes's skink		
4	Egernia depressa	pygmy spiny-tailed skink		
5	<i>Tiliqua occipitalis</i>	Western blue tongued skink		
6	<i>Tiliqua scincoides scincoides</i>	Eastern blue tongued skink		
7	<i>Cyclodomorphus gerrardii</i>	<u><i>Pink Tongue Skink</i></u>		
8	<i>Ouroborus cataphractus</i>	Armadillo girdled lizard		
9	<i>Chamaeleolis porcus</i>	Oriente Bearded Anole		
10	<i>Uroplatus henkeli</i>	Henkel's leaftailed		



חטיבת פיקוח ואכיפה
האגף להגנה על החי והצומח

הצהרת המבקש:

1. אני מצהיר שבקשה זו הינה עבורי או עבור בית העסק שצוין למעלה ושכל הפרטים הם נכונים.
2. ידוע לי שכל עוד המינים המבוקשים לבחינה אינם מסווגים באף אחת מהרשימות, הם אסורים בסחר, בהחזקה ובהעברה עד לבחינתם ופרסום סיווגם לאחת משתי הרשימות.
3. אני מצהיר שאין בחזקתי מינים מתוך הרשימה שבטופס הבקשה אלא אם כן יש ברשותי היתרים בתוקף עבור אחזקתם.

חתימת המבקש

תאריך



חטיבת פיקוח ואכיפה
האגף להגנה על החי והצומח

בקשה לבחינה של מין חדש המבוקש ביבוא

הנחיות למילוי הטופס:

- יש לוודא שהמינים המבוקשים אינם מופיעים ברשימה הלבנה או השחורה המתפרסמת באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים בכתובת: <https://www.parks.org.il/sabag/>
- יש למלא את כל הפרטים בטופס בעזרת מחשב. טופס עם פרטים חסרים או בכתב-יד יוחזר למבקש ללא טיפול.
- את הטופס המלא יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל הבאה: import@npa.org.il

שם המבקש בעברית: _____ דן מדינה _____

שם המבקש באנגלית: _____ DAN MEDINA _____

ת"ז: _____

שם המוסד / העסק בעברית: _____ www.BlancoReptiles.com _____

כתובת מלאה: _____

מספר טלפון נייד _____ מספר טלפון נוסף: _____

כתובת דוא"ל: _____

משפחה: חרדונים AGAMIDAE

חרדונים



בתמונות חרדון מצוי ישראלי



Common Name:
Shield-tailed agama

משפחה
AGAMIDAE

Scientific Name:
Xenagama taylori



LC - אין דאגה בכלל למצבו בטבע - LEAST CONCERN
NON CITES



מידע כללי לשימור

- א. שם: מגן זנב אגאמה - SHIELD TAILED AGAMA
- ב. שם לטיני - XENAGAMA TAYLORI
- ג. CITES - לא נמצא ברשימות
- ד. IUCN מקוטרג - LC LEAST CONCERN

סקירה

אטימולוגיה:

מוצאו של השם הספיציפי זה לכבוד קצין בריטי בדרגת קפטן R.H.R TAYLOR.

אזור גיאוגרפי/תפוצה

סומליה, ואתיופיה

צורת הרבעיה

X טלרי הינו אוביפארוס

מקום מחיה



X. taylori חי על אדמה צחיחה ושטוחה, לפעמים על נופים גבעות, קרקע חולית אך גם קשה, שם הוא חופר גלריות עמוקות. הוא שורד בטמפרטורה של 45 עד 50 מעלות צלזיוס (113 עד 122 מעלות פרנהייט), אך הממוצע נע בין 25 ל-35 מעלות צלזיוס (77 ו-95 מעלות פרנהייט) בסביבות יבשות מאוד, למעט סופות אביב חזקות ולחות גבוהה.

תיאור החיה וגודלו

אורכם הכולל של מבוגרים של X. taylori הוא פחות מ-10 ס"מ (4 אינץ') (כולל זנב), והבקעים הם קצת יותר מסנטימטר (3/8

משפחה AGAMIDAE

אינץ' ומשקלם רק 3 גרם (0.11 אונקיה).

צורת התגוננות

כמו רוב מיני הקסנאגאמה האחרים, X. taylori יסתתר בתוך מאורות מתוצרת עצמית וישתמש בזנב דמוי הפיתול, הבנוי בכב' דות, כדי לסגור את המאורה כדי להתחמק מטורפים.

תזונה

בהיותו לטאה קטנה, X. taylori הוא בעיקרו אוכל חרקים, אך נראה שהוא אוכל עשבים, פירות ופירות יער.

דימורפיזם מיני

X. taylori הוא דימורפי מינית. זכרים בוגרים מינית מציגים צבע רבייה של כחול תוסס על הגרון במשך תקופה קצרה של השנה. לזכרים בוגרים יש נקבוביות עצם הירך גדולות יותר המוקפות בחומר צהוב פרומונאלי שעווה.

סיבת בקשה ואישורו של חיה זאת והוספתו לרשימה הלבנה

(1) אין שוני בין האגאמה הזה לבין החרדון המזוקן האוסטרלי שכבר מאושר בארצנו.

(2) הוא איננו יכול להתקיים ברוב חלקי הארץ ואיננו גורם סיכון כמין פולש.

(3) איננו מסכן את הציפורים או כל חיה אחרת שבטבע הישראלי

איזה תכונה	נקודות
לא קיימים מין פולשים מסוג XENAGAMA TAYLORI	-
משפחת אגאמידי קיים בארץ אבל לא את הסוג X. TAYLORI	1
למין יש התאמה אקלימית עם האקלים בארץ אקלים מדברי	1
בעל תפוצה גדולה מ-20,000 קמ"ר - נראה שהם מוקדים באזור מסויים בין סומליה לאתיופיה	-
סה"כ נקודות	2

המין עונה על כל הקריטריונים שהציבה הרשות ולכן אין מניעה של יבוא וסחר שלו בישראל.

(1) אתר CITES

<https://www.cites.org/eng/app/appendices.php>

(2) אתר IUCN

<https://www.iucnredlist.org/species/17451283/17451292>

Spawls, S. (2021). "Xenagama taylori". IUCN Red List of Threatened Species. 2021: ^ (3 e.T17451283A17451292. doi:10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T17451283A17451292.en. Retrieved 19 November 2021.

<https://search.invasivespeciesinfo.gov/search?query=Shield-tailed+agama&affiliate=nic&op=Submit+S> earch

Beolens, Bo; Watkins, Michael; Grayson, Michael (2011). The Eponym Dictionary of Reptiles. ^ .4 Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. (Xenagama taylori, p. (262).

משפחה
AGAMIDAE



משפחה : Eublepharidae

שממיות

Cat gecko, *Aeluroscalabotes felinus*, Borneo.



Japanese Cave Geckos



GEKKONIDAE

Common Name (שם נפוץ):
Henkel's leaftailed gecko

Scientific Name (שם מדעי):
Uroplatus henkeli

CITES II - APPENDIX II



VU - VULNERABLE



GEKKONIDAE

:(שם נפוץ)Common Name
Borneo Cat Geckos

Scientific Name(שם מדעי):
Aeluroscalabotes cf. dorsali

NON CITES

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

LEAST CONCERN - אין דאגה בכלל למצבו בטבע - LC



משפחה : Scincidae

חומטים

Name/שם	Scientific Name	Picture		
Adelaide pygmy blue-tongue skink				

Common Name (שם נפוץ):
pink-tongued skink

Scientific Name (שם מדעי):
pink-tongued skink

NON CITES



LC - אין דאגה בכלל למצבו בטבע - LEAST CONCERN



חוו"ד לפי הקריטריונים החדשים לסיווג מינים

סקירה

חומט לשון ורודה (*Cyclodomorphus gerrardii*) היא זן של לטאה ממשפחת ה-*Scincidae*. *C. gerrardii* אנדמי לאוסטרליה, שם הוא מכונה בדרך כלל גם לטאה ורודה-לשון. כפי שמציעים שמות נפוצים אלה, המאפיין המבחין שלה הוא לשון ורודה בניגוד לחומט לשון הכחולה.

אטימולוגיה:

השם הספציפי, *gerrardii*, הוא לכבודו של הרפטולוג הבריטי טי אדוארד ג'רארד (1810-1910), שהיה "יד ימינו" של גריי במוזיאון הבריטי. [3]

אזור גיאוגרפי/תפוצה

C. gerrardii אנדמי לאוסטרליה. ניתן למצוא אותו מספרינגווד, ניו סאות' ויילס, לאורך מדינת החוף המזרחית והטווחים המזרחיים עד לאזור קיירנס, קווינסלנד.

צורת הרבעיה

ב-*C. gerrardii* החיזור מתרחש בתחילת האביב למשך תקופה של שישה שבועות, שבמהלכם נצפו זכרים נלחמים. בהזדווגות, הזכר תופס את ראשה של הנקבה במלתעותיו ועולה עליה. לאחר תקופת הריון משוערת של 101 עד 110 ימים, הנקבות מייצרות המלטות גדולות של 20 עד 30 (הכי גדול מתועד: 67) צעירות חיים בתחילת הקיץ. [4] במהלך הלידה, הנקבה מחזיקה את רגליה האחוריות צמודות לגופה, כמו כשהן נעות בדשא, ויולדת לידות יחיד בערך כל 30 דקות שבמהלכן היא מסתר

Pink-tongued skink

חומט ורוד לשון

Conservative statues - בטבע



אין דאגה בכלל למצבו בטבע
Least Concern (IUCN 3.1)[1]

מגדר מדעי - Scientific classification

Kingdom:	Animalia	: ממלכה
Phylum:	Chordata	: פילום
Class:	Reptilia	: מחלקה
Order:	Squamata	: סדרה
Family:	Scincidae	: משפחה
Genus:	Cyclodomorphus	: גנוס
Species:	<i>C. gerrardii</i>	: מין

Binomial name

Common Name (שם נפוץ):
pink-tongued skink

Scientific Name (שם מדעי):
pink-tongued skink

NON CITES






LEAST CONCERN - אין דאגה בכלל למצבו בטבע - LC

בבת. הצעירים נולדים מכורבלים בקרום עוברי, אותו הם אוכלים לאחר שהשתחררו. מיד לאחר הלידה, הצעירים מתחילים להבהב בלשונם. הלשון והפה כחולים כהים ומשטח הגחון שחור אצל צעירים, משתנה לורוד וסגול בהתאמה לאחר כשלושה חודשים. הצעירים עצמאיים מיד לאחר הלידה ללא כל טיפול הורי ומתחילים להאכיל משבוללים וחלזונות. גיל בבגרות מינית הוא כ-22 חודשים.

מקום מחיה

C. gerrardii מאכלס יערות סקלרופילים רטובים ויערות גשם וכן באזורים לחים ביערות. הוא מחסה מתחת לפסולת עלים, בבולי עץ חלולים ובנקיקים של סלעים ועצים. גופו וגפיו הדקיקים הם התאמה לתנועה בסבך עבות. *C. gerrardii* נע בגליות רוחביות על משטחים חלקים, אך מחזיק את גפיו האחוריות צמודות לגוף ומניע את זנבו בתנועה מתפתלת צדדית בעת תנועה בדשא ובעת טיפוס על ענפים, תוך שימוש רק בגפיים הקדמיות. תזונתו העיקרית מורכבת מחלזונות ושבוללים, עבורם הוא מחפש מזון בשעות הדמדומים ובלילה בקיץ, וגם במהלך היום בחודשים הקרירים יותר. כדי לרסק את קונכיית החלזונות, *C. gerrardii* משתמש בשיניו הגדולות והשטוחות בחלק האחורי של הלסת העליונה והתחתונה. *C. gerrardii* הוא מטפס טוב, משתמש בזנבו החצי-גרעיני כעזר תומך, ולמרות שרק חלקו הוא עץ, מטפס על עצים כדי להאכיל בעת הצורך. נראה שהצעירים מטפסים על צמחייה בתדירות גבוהה יותר כדי להימנע מטרפה. כאשר מאוים, *C. gerrardii* מרים את גופו מהקרקע כדי להראות גדול יותר, ומרצד או רוטט את לשונו במהירות בדומה לנחשים.

<http://www.bom.gov.au>



חוץ מאשר איזור מצומצם ביותר באוסטרליה אין שום דמיון בין הטפוגרפיה והאקלים האוסטרלי לאקלים הישראלי חוץ מאשר החום. אוסטרליה יש לה מדבר רטוב עם משקעים משהו שאין אותו בארץ לכן רוב המוחלט של החיות של אוסטרליה יתקשו לשרוד בארצנו ללא מקרו אקלים של לחות ויותר משקעים גם באזורים החמים ביותר לעומת מדינת ישראל שיבש וצחיח.

SKINKS חומטים

Common Name (שם נפוץ):

pink-tongued skink

Scientific Name (שם מדעי):

pink-tongued skink

NON CITES



LC - אין דאגה בכלל למצבו בטבע - LEAST CONCERN

נקודות	איזה תכונה
-	לא קיימים מין פולשים מסוג XENAGAMA TAYLORI
1	משפחת אגאמידי קיים בארץ אבל לא את הסוג X.TAYLORI
1	למין יש התאמה אקלימית עם האקלים בארץ אקלים מדברי
-	בעל תפוצה גדולה מ-20,000 קמ"ר - נראה שהם מוקדים באזור מסויים בין סומליה לאתיופיה
2	סה"כ נקודות